



HAPIH



MINISTARSTVO
POLJOPRIVREDE

Kako suzbiti crnu štitastu uš araukarije na maslini

Dario Ivić, Ivana Jakovljević i Lidia Bradarić



HAPIH



MINISTARSTVO
POLJOPRIVREDE

Naslov:

Kako suzbiti crnu štitastu uš araukarije na maslini

Autori:

Dario Ivic, Ivana Jakovljevic i Lidia Bradaric

Nakladnik:

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske

Uli. grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

Urednica:

dr. sc. Zdravka Sever

Recenzent:

dr. sc. Željko Budinščak

Lektorica:

Jasminka Čovran

Grafička priprema i tisk:

Grafiti Becker d.o.o.

Naklada:

200 primjeraka

Fotografie:

HAPIH

ISBN

978-953-7867-21-8

Zagreb, ožujak 2022.

Kako suzbiti crnu štitastu uš araukarije na maslini

Dario Ivic, Ivana Jakovljevic i Lidia Bradaric

Sadržaj

Novi štetnik na maslini

Novi štetnik na maslini	5
Opis štetnika – prepoznatljivi štitovi	6
Biologija štetnika - dvije generacije godišnje	6
Štete koje uzrokuje crna štitasta uš	7
Napada brojne voćne vrste, vinovu lozu, ukrasno bilje	8
Pravodobno suzbijanje - ključ uspjeha	9
Strategija: kombinirano suzbijanje štetnika masline	14
Koristiti samo registrirana sredstva	15
Nužno sustavno provođenje mjera	17
Literatura	18

Crna štitasta uš araukarije (*Lindingaspis rossi* Maskel) u Hrvatskoj nije bila utvrđena sve do 2014. godine, kada je nađena u Sutivanu na otoku Braču. Prvi je put nađena na maslini. Maslina na kojoj je štetnik utvrđen nalazila se u blizini kanarskih palmi koje su, pokazalo se, također bile napadnute. Palme su podrijetlom iz Argentine, pa se pretpostavlja da je ta štitasta uš u Sutivan unesena upravo s palmama.

Do početka 2022. godine utvrđena je na područjima Sutivan, Mirca i Supetra na otoku Braču. U samom Sutivanu jако je prošrena, a na šrem području Supetra još je uvijek samo lokalno prisutna, tek u fazi širenja. Osobito se proširila na maslinu, koja je očigledno domaćin na kojem se intenzivno razvija.



Slike 3. Crna štitasta uš na listovima masline

Širenje crne štitaste uši može se spriječiti, a štete u maslinarskoj proizvodnji smanjiti, jedino provođenjem sustavnih mjera suzbijanja u koje će biti uključeni lokalni poljoprivrednici, zajednica i stručnjaci. Crna štitasta uš araukarije fiziološki je štetnik brojnih vrsta biljaka koji može, ako ne poduzmemo odgovarajuće mjere suzbijanja, prouzročiti klorozu i oslabiti biljku te, premda rijetko, može uzrokovati i propadanje napadnuta biljaka. Posjednici bilja moraju itekako voditi računa da se ne pojavi u njihovim nasadima. Ako se pojavi, potrebno je na vrijeme poduzeti sve dostupne mjere suzbijanja toga opasnog štetnika.

Opis štetnika - prepoznatljivi štitovi

Štitaste uši karakteristični su bijjni štethici čije je tijelo prekriveno „štitem“, tvrdom i čvrstom strukturom koja ih štiti. Hrane se sisanjem bijnog soka. Štitovi crne štitaste uši araukarije ovalni su do okruglasti, splošteni i promjera 2 - 2,5 mm. Mogu biti bijeli, sivi do svijetlosmeđi. Tijela odraslih ženki i mužjaka te ličinke i jaja nalaze se ispod štita. Pokretnе su samo ličinke prvog stadija.



Ulika 3: Ličinke prvog stadija i jaja ispod štita odrasle ženke na listu palme

Biologija štetnika - dvije generacije godišnje

Crna štitasta uš masline nepokretna je u svim stadijima, osim u prvom stadiju ličinki. Štitovi su čvrsto fiksirani za bijlne organe. Ličinke prvog stadija kреću se, a mogu se širiti i zračnim strujanjima. Po nasadu se mogu prenosiť škarama i drugim pomagalima ili strojevima, te kukcima i pticama. Dosada provedena istraživanja ukazuju na to da crna štitasta uš u uvjetima otoka Brača razvija dvije generacije tijekom godine.

Prva genevacija na maslini započinje s izlaskom pokretnih ličinki u proljeće, potkraj ožujka i na početku travnja. Nalazi se većinom na naličju listova. Druga generacija započinje potkraj svibnja, kada pokretni stadiji ličinki prelaze na zametnute plodove masline.



Ulika 4: Štitova odrasla ženka

Štete koje uzrokuje crna štitasta uš

Crna štitasta uš iscrpljuje bijliku sisanjem bijnog soka. Štete su obično povezane s brojem jedinki štethika na bijlnim organima. Ako se radi o njihovu veliku broju, bijlka slabí.

Na maslini u „okolici“ Sutivana забиљежено je i do 120 jedinki štitastih uš po listu. Nažalost, crna štitasta uš kolonizira i plodove masline. Na plodovima забиљежено је јако стотинjak jedinki tog štethika. Takvi plodovi пријевремено сазрјевају. Kakvoća ulja od jako нападнутih plodova itekako је смањена. Оsim тога, такви су плодови неупотребљиви у производњи столних маслина.



Ulika 4: Štitova napada na plodovima masline

Napada brojne voćne vrste, vinova lozu, ukrasno bilje

Crna štitasta uš napada mnoge biljke. Domačini štetnika postaju različite vrste ukrasnog i samoniklog bilja, mnogobrojne voćne vrste, maslina i vinova loza.

Maslina se pokazala osjetljivim domaćinom na kojem se crna štitasta uš intenzivno razvija. U Supetru i okolicu, gdje se osobito proširila, crna štitasta uš nađena je na dvadesetak biljnih vrsta. Među ukrasnim biljkama najjače su napadnute palme. Štetnik je nađen i na oleandru, šimširu, kuriki, jorgovanu i lozici. Među samoniklim su biljkama jaki napadi štetnika zabilježeni na bršljanu, a nešto slabiji na tršnji i divljoj kupini.

Što se voćnih kultura tiče, štetnik je u Sutivanu i okolicu utvrđen na smokvi, sipku, orahu, murvi, rogaču i limunu, a zabilježen je i na vinovoj lozi.

U svijetu je crna štitasta uš zabilježena na biljkama iz čak 62 porodice. Među njima nalaze se brojne biljke prirodno rasirene u mediteranskom području Hrvatske, koje se koriste kao ukrasno bilje ili se uzgajaju kao poljoprivredne kulture. Biljke domaćini najčešće su palme iz porodice Arecaceae, araukarija, bagrem, lovor, fikus, eukaliptus, kalina, bor, kamelija, agrumi, kaki, kruška i jabuka.

Štitaste uši imaju velik broj prirodnih neprijatelja. Crna štitasta uš nova je vrsta u Hrvatskoj, unesena iz stranog područja. U takvoj je situaciji obično potrebno određeno vrijeme da bi domaći i udomaćeni prirodni neprijatelji smanjili populaciju stranog štetnika. Prirodni neprijatelji crne štitaste uši araukarije zasigurno su se već pojavili ili će se pojaviti. Pojavu prirodnih neprijatelja potrebno je imati na umu pri korištenju kemikalijih sredstava za zaštitu bilja jer se prirodni neprijatelji moraju nastojati očuvati.

Od potencijalnih prirodnih neprijatelja u našem području može se istaknuti vrsta *Scutellista cyanea*, čije se ličinke hrane jajima maslinova medića. Vrsta *Exochomus quadripustulatus* raspširovanjen je grabežljivac jaja i ličinki štitastih uši, a *Chilocorus bipustulatus* i *Chrysoperla carnea* (Neuroptera, Chrysopidae) grabežljive su vrste također prisutne na području Hrvatske. *Rhyzobius forestieri* također se hrani jajima i ličinkama maslinina medića, a potencijalno može biti učinkovit predator crne štitaste uši araukarije.

Pravodobno suzbijanje - ključ uspjeha

Štitaste uši općenito su štetnici čije suzbijanje može biti otežano. Međutim, pravodobnim poduzimanjem pojedinih mjera te kombinacijom različitih mjera može se vrlo učinkovito postizati.

MEHANIČKE MJERE

Crna štitasta uš araukarije uglavnom je nepokretna. Kako bi se njezin potencijal smanjio, preporučljivo je, po mogućnosti rezom, uklanjati napadnute dijelove biljke. Samonikle biljke napadnute štetnikom potrebno je ukloniti iz okolice maslinika.

BIOLOŠKE MJERE



Snimka 5. Uši napad na listovima brijšjana / Crna štitasta uš na listu palme



Snimka 7. I. prirodni neprijatelji crne štitaste uši masline - *Scutellista cyanea* (lijevo) i *Chrysoperla carnea* (desno).

KEMIJSKE MJERE

Jake napade crne štitaste uši na maslinama treba suzbijati usmjerrenom kemijskom zaštitom. Korištenje kemijskih sredstava mora biti usmjereni, razumno, sustavno i temeljito. Samo je tako moguće postići visoku učinkovitost kemijskih sredstava, uz ekonomsku isplativost, čuvanje okoliša i zdravlja ljudi.

Za učinkovito suzbijanje treba poznavati životni ciklus štetnika, odnosno vrijeme pojave njegovih pojedinih razvojnih stadija koje je moguće učinkovito suzbiti kemijskim mjerama. Određivanje optimalnih rokova suzbijanja može se utvrditi samo redovitim i preciznim praćenjem dinamike populacije, odnosno početka, vrhunca i kraja pojave pojedinih stadija štetnika. To je posebno važno kod štitastih uši jer one veći dio života žive ispod štitova kojih spašavaju od djelovanja insekticida.

Važno je znati da je za kemijsko suzbijanje u Hrvatskoj trenutačno dopušteno samo jedno sredstvo koje je registrirano izričito za suzbijanje crne štitaste uši araukarije. Drugo takvo sredstvo izgubilo je dozvolu sredinom prošle godine. U takvim okolnostima koriste se sredstva koja su odobrena za suzbijanje štitastih uši općenito ili određenih štitastih uši koje se u nas pojavljuju na maslini. Također, dosad provedena istraživanja pokazuju da na crnu štitastu uši dobro djeluju sredstva koja se na maslini koriste za suzbijanje drugih štetnika, poput maslinine muhe (*Bactrocera oleae*) ili maslinova moljca (*Prays oleae*).

Ovim program zaštite masline usmjeren na glavne štetnike i štitaste uši prikazan je u tablici.

„Akcijski“ implementacijski program zaštite masline od štetnika, s ciljanim suzbijanjem štitastih uši, bio je ugovoren i registriran za suzbijanje štetnika na maslini (izvor: <https://fs.mos.hr/> mirovanje)

Priroda	Mirovanje vegetacije	Sredstva za zaštitu bilja	Ciljani štetni organizmi
---------	----------------------	---------------------------	--------------------------

Mirovanje vegetacije



Bijelo ulje®, Mineralno
Svijetlo ulje®, Prominal Neu®,
Ovipron Top®, Red Fox®

Štitaste uši



Pyral®

maslinin moljac
maslinina buha
štitaste uši

Prodati veličine zrna pšenice



Decis 2,5 EC®, Decis 100 EC®,
Poleci Plus®, Scatto®, Rotor
Super®, Ritmus®, Demetrina
25 EC®, imidan 50 WG®,
Delegate 250 WG

maslinin moljac
maslinin svrdlaš
štitaste uši

Rast plodova



Decis 2,5 EC®, Decis 100 EC®,
Poleci Plus®, Scatto®, Rotor
Super®, Ritmus®, Demetrina
25 EC®, imidan 50 WG®,
Delegate 250 WG

maslinin moljac
maslinin muha
maslinin svrdlaš
maslinina buha
štitaste uši

Od kemijskih su sredstava mineralna ulja osnova u suzbijanju štitastih uši. To su sredstva koja se koriste u mirovanju vegetacije ili u vegetaciji, prekrivaju štitove štitastih uši i tako ih guše. U Hrvatskoj su dostupna sredstva koja su opisana u nastavku.

Bijelo ulje®

Sredstvo je registrirano za suzbijanje maslinine štitaste uši (*Pollinia pollinii*) i štitastih uši općenito na maslini. Koriste se u mirovanju vegetacije („zimsko tretiranje“) ili u vegetaciji („ljeto tretiranje“). Smiju se primjenjivati do kraja srpnja. U mirovanju vegetacije koriste se u višoj koncentraciji.

Mineralno svjetlo ulje®

Sredstvo je registrirano, među ostalim, za suzbijanje crne štitaste uši araukarije na maslini. Može se primjenjiti dva puta, do kraja srpnja. U vegetaciji se koristi u koncentraciji od 1 - 2 %, a u mirovanju vegetacije u koncentraciji od 3 - 4 %.

Promana Neu®

Odobren je za suzbijanje maslinova medića (*Saissetia oleae*). Može se koristiti jednom godišnje, od završetka cvatnje do 70-postotne veličine plodova.

Ovipron Top®

Također je odobren za suzbijanje maslinova medića. Može se koristiti dva puta, od svibnja do rujna.

Red Fox®

Sredstvo je kombinacija bakrenih spojeva koji djeluju kao fungicidi te mineralnog ulja koje ima insekticidno djelovanje. Odobreno je za suzbijanje paunova oka, olovne bolesti i maslinova medića. Može se koristiti dva puta u sezoni.

Imidan 50 WG®

Aktivna tvar u sredstvu je piripoksifen. Sredstvu je inače ukinuta registracija, a krajnji je rok za primjenu zaliha 1. veljače 2023. godine. Sredstvo je bilo registrirano za suzbijanje crne štitaste uši araukarije, jednom tijekom sezone, prije cvatnje.

Decis 2,5 EC®, Decis 100 EC®, Poleci Plus®, Scatto®, Rotor Super®, Ritmus®, Demetrina 25 EC®

Aktivna tvar u svim sredstvima je deltametrin. Ovisno o sredstvu, koriste se za suzbijanje maslinina moljca, maslinine muhe, maslinina moljca i maslinine muhe, u različitim prikladnim rokovima, najviše dva puta tijekom vegetacije, uz karencu od 21 dan.

Kod jakih napada štitastih uši primjena mineralnih ulja često nije dovoljna.

Tada se koriste i drugi insekticidi. Za nijihu učinkovitost klijučno je da se primjene u pravom trenutku. Štitaste uši ispod štiova prilično su otporne na sve insekticide. Međutim, ličinke su, nakon što napuste štit i kreću se po biljici, vrlo osjetljive na većinu insekticida. Zato je primjena najučinkovitija u trenutku kada takve pokrethe ličinke masovno izlaze iz štiova. Pri tretiranju treba dobro „okupati“ cijelu krošnju.

Prema dosadašnjim su istraživanjima vrlo visoku učinkovitost u suzbijanju crne štitaste uši na maslini pokazali insekticidi na osnovi deltametrina, fosmeta i piriproksifena. Orientacijski optimalni rok za primjenu tih sredstava bio bi potkraj ožujka ili na početku travnja (za suzbijanje prve generacije štitnika) te potkraj svibnja ili u početku lipnja (za suzbijanje druge generacije štitnika). Prema načelima integrirane zaštite bilja pravi se trenutak za primjenu insekticida može odrediti samo na osnovi vizualna pregleda i analize početka izlaska pokretnih stadija ličinki štitaste uši iz jaja ispod štita.

Budući da spomenuta sredstva nisu odobrena za suzbijanje crne štitaste uši, njihovu primjenu trebalo bi kombinirati sa zaštitom od maslinina moljca. Sredstva koja se mogu koristiti za suzbijanje crne štitaste uši na maslini opisana su u nastavku.

Pyxal®*

Aktivna tvar u sredstvu je piripoksifen. Registracija sredstva bit će ukinuta u svibnju



Glede na način na kojem se učvrstite i miruju te počinju lučiti voštanu prevlaku.

potkraj ožujka i početkom travnja, ovisno o vremenskim prilikama. Ličinke prvog stadija najojetljivije su i zbog toga ih je najlakše suzbiti. Nakon što napuste štit ženke, ličinki se učvrste i miruju te počinju lučiti voštanu prevlaku. Treće tretiranje treba provoditi 110 do 14 dana nakon drugog tretmana u svrhu suzbijanja ličinki.

Strategija: kombinirano suzbijanje štetnika masline

Strategija kemijskog suzbijanja crne štitaste uši na maslini može biti kombinirana sa suzbijanjem drugih gospodarski važnih štetnika i usmjerena upravo na to. Pristup suzbijanju ovisi ponajprije o jačini zaraze. U slabije napadnutim maslinicima može biti dovoljna jedna primjena mineralnog ulja u mirovanju vegetacije, ili poslije u vegetaciji. Općenito, pristup suzbijanju crne štitaste uši može biti različit i potrebljivo ga je priлагoditi situaciji.

U srednje napadnutim maslinicima, mineralna ulja mogu se koristiti potkraj zime ili na početku proljeća. Crna štitasta uš može se suzbijati zajedno s cvjetnom generacijom maslinina moljca potkraj svibnja. Za tu namjenu koriste se (prije navedena) sredstva na osnovi deltametrina, fosmetra ili spinetorama. Uz to, mineralna ulja mogu se dodatno usmjereno primjeniti i tijekom vegetacije.

U jače napadnutim maslinicima strategiju suzbijanja populacije crne štitaste uši treba podrediti pojavi određenih štetnikovih stadija. Suzbijanje crne štitaste uši kod visoke populacije preporučujemo u dva do tri roka. Prvo tretiranje obavlja se potkraj zime ili početkom proljeća. Za tu namjenu koriste se mineralna ulja. Drugo tretiranje obavlja se pojavom ličinki prvog stadija prve generacije, koje izlaze ispod štita ženke i naseljavaju biljne dijelove, najviše naličje listova. Izlazak ličinki prve generacije ispod štita počinje

Glede uporabe sredstava za zaštitu bilja potrebno je naglasiti da je zakonski propisano kako se sredstva mogu koristiti samo ako su odobrena (registrivana) za uporabu u Hrvatskoj. Nadalje, sva sredstva za zaštitu bilja moraju se koristiti sukladno s dozvolom, odnosno etiketom.

U ostalim su zemljama Europske unije za suzbijanje crne štitaste uši araukarije registrirana sredstva na osnovi mineralnih ulja. Druga sredstva nisu izričito registrirana za suzbijanje crne štitaste uši araukarije, nego za relativno brojne druge vrste štitastih uši koje napadaju maslinu, voćke ili ukrasno bilje. Treba imati u vidu da maslinu u Europi, uključujući Hrvatsku, napada veći broj drugih vrsta štitastih uši. Tu se ističu *Saissetia oleae*, *Parlatoria oleae* ili *Lichtensis viburni*. Za suzbijanje tih štitastih uši ili štitastih uši općenito, bez isticanja vrste, u Italiji, Španjolskoj, Portugalu i Grčkoj također su registrirani insekticidi na osnovi mineralnih ulja, deltametrina, fosmetra, piriproksifena, ali i pojedini pripravci na osnovi acetamiprida, sulfoksifona i spirotetramata.

Prema trenutačno važećim pravilima, sredstva za zaštitu bilja u Hrvatskoj odobravaju se standardnim postupkom registracije, koju podnosi proizvođač sredstva, zastupnik ili distributer. Međutim, može se tražiti proširenje registracije u svrhu „male namjene“ pojedinog već odobrenog sredstva u Hrvatskoj. Takvu registraciju mogu zatražiti „službena ili znanstvena tijela koja se bave poljoprivrednom djelatnošću“, „professionalne poljoprivredne udruge“ ili „professionalni korisnici“. Dakle, takav zahtjev može podnijeti i individualni poljoprivrednik. Također, može se odobriti pojedino sredstvo kao dozvola u hitnim situacijama zbog opasnosti koja se ne može obuzdati na drugi zadovoljavajući način, koje također može zatražiti sam poljoprivrednik ili poljoprivredna udruga.

Za odobrenje pojedine sredstva za zaštitu bilja za „male namjene“ podnosi se zahtjev Ministarstvu poljoprivrede. Uz zahtjev prilaže se etiketa i/ili dozvola

za istovjetno sredstvo iz države članice Europske unije odgovarajuće zone.

Također, prilaže se i druga relevantna dokumentacija o tom sredstvu, ako postoji i ako je dostupna. Dozvola za „male namjene“ izdaje se na duže vremensko razdoblje, onolikو koliko traje standardna dozvola za to sredstvo. Administrativno se takvo odobrenje naziva „proširenjem primjene sredstva.“

Za odobrenje pojedinog sredstva za zaštitu bilja u hitnim situacijama podnosi se zahtjev Ministarstvu poljoprivrede. U zahtjevu se navodi tko podnosi zahtjev, o kojem je sredstvu riječ, za koju namjenu se traži, zašto je zahtjev opravдан, za koju količinu sredstva se traži odobrenje te odakle bi se sredstvo dobavilo. Također, predlažu se uvjeti korištenja sredstva. Dozvola u hitnim situacijama dobiva se na razdoblje od 120 dana.

Važno je napomenuti da u oba slučaja (odobrenje za „male namjene“ i „odobrenje u hitnim situacijama“) zahtjeve analizira Ministarstvo poljoprivrede, koje može zatražiti dodatna pojašnjenja i dopunu zahtjeva. Nakon toga, HAPIH provodi procjenu rizika te daje Ministarstvu mišljenje. Ako se rizik ocijeni neprihvatljivim, Ministarstvo može odbiti zahtjev, no može ga i odobriti ako procijeni da potreba i korist premašuju rizik.



Nužno sustavno provođenje mjera

Mjere suzbijanja crne štitaste uši araukarije na ograničenu području otoka Brača treba sustavno provoditi. U suzbijanje se moraju uključiti poljoprivrednici, ali i lokalna zajednica. Kod novih nalaza štetnika u novim područjima treba pokušati iskorijeniti štetnika prije nego što se proširi. Zbog toga je premeštanje biljaka u nova područja bolje izbjegavati ili ga provoditi s oprezom, kako se štetnik ne bi nemamjerno širio dalje. Napadnuto samoniklo bilje preporučljivo je ukloniti, a na ukrasnom bilju treba provoditi mjere suzbijanja.

Praćenje biologije, raširenosti i razvoja crne štitaste uši temelj je za sprečavanje njezina širenja i za učinkovito suzbijanje. Da bi to bilo uspješno, potrebna je suradnja državnih institucija, stručnih službi, lokalne samouprave, poljoprivrednika i stanovništva.

Ako ste učili crne štitaste uši araukarije, za sve savjete u vezi s njezinim suzbijanjem slobodno se obratite stručnjacima Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu - Centru za zaštitu bilja:

Ivana Jakovljević, dipl. ing.

091 2300 634

ivana.jakovljevic@hapih.hr

Lidia Brdaric, dipl. ing.

099 5465 273

lidia.bradaric@hapih.hr

Drago Đoko, dipl. ing.

099 5465 273

drago.doko@hapih.hr

Literatura

Bjeliš, M. (2009). Zaštita masline u ekološkoj proizvodnji. Vlastita naklada, Solin, 208 str.

Bjeliš, M., Masten Milek, T., Mišetić, M. (2015). Preliminarni rezultati istraživanja suzbijanja novo introducirane vrste *Lindingaspis rossi* Maskell 1989 (Hemiptera: Coccoidea; Diaspididae) na maslini. Glasilo biljne zaštite 6, 419-425.

FIS (2022). Popis registriranih sredstava za zaštitu bilja.
<https://fis.mps.hr/trazilicaszb/> (pristup veljača 2022.).

Masten Milek, T., Bjeliš, M., Šimala, M. (2010). The scale insects (Hemiptera: Coccoidea) and their natural enemies in Croatia olive groves. Proceedings of meeting of Working Group "Integrated Protection of Olive Crops", Cordoba, IOBC/WPRS Bulletin 59, 65.

Masten Milek, T., Šimala, M. (2012). Štitaste uši (Hemiptera: Coccoidea) na maslini (*Olea europaea* L.). Glasilo biljne zaštite 4, 285-297.

Masten Milek, T., Bjeliš, M., Šimala, M. (2015). Prvi nalaz crne štitaste uši araukarije *Lindingaspis rossi* (Maskell 1891) (Hemiptera: Diaspididae). Glasilo biljne zaštite 3, 207-214.

Miller, D.R., Davidson, J.A. (2005). Armored scale insect pests of trees and shrubs. Cornell University Press, New York, SAD, 442 str.