

Popilia japonica

P. Japonica (Japanski pivac) izrazito je polifagna vrsta
- prioritetni karantenski štetni organizam.

Odrasli razvojni stadiji su vrlo proždrljivi, izgrizaju lišće, ostavljajući samo lisne žile.

Ličinke žive u tlu na korijenu trava i najbrojnije su na obrađivanim travnjacima, golf terenima, a rjeđe na pašnjacima.

Napada više od 300 biljnih vrsta, a najvažnije su: vinova loza, soja, kukuruz, trešnja, šljiva, breskva, ruža, kesten pitomi, kesten divlji, platana, javor, brijest, lipa, vrba.

ODRASLI STADIJI

defolijatori (uzrokuju
otpadanje lišća)

skeletiraju lišće (izgrizaju
lišće između žila)


hrane se cvjetovima te
plodovima

LIČINKE


ishranom na korijenu
uzrokuju žučenje i vunuće
biljaka

štete se više očituju u kasno
ljetu ili ranu jesen uslijed
nedostatka vlage





U Hrvatskoj vrsta *P. japonica* do sada nije zabilježena. Ukoliko dođe do njenog unosa u Hrvatsku, može imati veliki utjecaj na ratarske usjeve, voćne vrste, ukrasno bilje, šumske listopadne vrste i travnjake.



Odrasli kukci su metalno zelene i bakrenaste boje, duljine oko 1 cm, s karakterističnim nakupinama bijelih dlačica na bočnom i stražnjem dijelu zatka.

U slučaju sumnje na prisutnost karantenskog štetnika obratite se na sljedeće kontakte:
czb@hapih.hr, fitosanitarna.inspekcija@dirh.hr